



IM VORAUS:
**Das Gewicht des Tieres
 ermitteln und notieren !!!**
(Wichtig für die Dosierung)

**Weitere Behandlung bei
 deutlichen Symptomen**
 Krampfen, Sabbern, Kleine Pupillen
Atropine in den Muskel spritzen
 0,1 mg pro kg Körpergewicht
 10 Minuten warten, bei Bedarf mehrmals
 wiederholen

Aufhören, wenn die Pupillen
 vergrößert sind

Wenn das Tier noch krampft kann man
Diazepam in den Muskel spritzen
 0,1 mg pro kg Körpergewicht
NICHT MEHR!

**So schnell wie möglich
 Tierarzt aufsuchen**
 Tropf zu Ausspülen des Giftes

Im Anfangsstadium
 bis ca. 2 Stunden nach Aufnahme des Giftes
 Zum Erbrechen bringen

Salzwasser einflößen mit Spritze
ohne Nadel

oder

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hunde | Katzen |
| <u>Filtalon</u> | <u>Atropine</u> |
| unter die Haut spritzen | unter die Haut spritzen |
| 1 ml pro 10 kg Körpergewicht | 1 ml pro 5 kg Körpergewicht |
| NICHT MEHR ! | |

Evtl. Konaktion als Tabletten weiter geben
 (mit Tierarzt absprechen)

Tierarzt aufsuchen !!!
 Tropf zum Ausspülen des Giftes

3 Tage weiterspritzen

| | |
|------------------------|------------------------|
| Hunde | Katzen |
| 1 ml pro Tag | 1 ml pro Tag |
| pro 5 kg Körpergewicht | pro 5 kg Körpergewicht |

Konaktion (Vitamin K)
 in den Muskel spritzen

ORGANOPHOSPHATE
 Pflanzenschutzmittel
 Linate

Krampfen, Sabbern,
 kleine Pupillen

VERGIFTUNGEN

Blutungen,
 weiße Schleimhäute

RATTENGIFT