



ORGANOPHOSPHATE
Pflanzenschutzmittel
Linate

Krampfen, Sabbern,
kleine Pupillen

VERGIFTUNGEN

Blutungen,
weiße Schleimhäute

RATTENGIFT

Im Anfangsstadium
bis ca. 2 Stunden nach Aufnahme des Giftes
Zum Erbrechen bringen

Salzwasser einflößen mit Spritze
ohne Nadel

oder

Hunde	Katzen
<u>Filtalon</u>	<u>Atropine</u>
unter die Haut spritzen	unter die Haut spritzen
1 ml pro 10 kg Körpergewicht	1 ml pro 5 kg Körpergewicht
NICHT MEHR !	

IM VORAUS:
**Das Gewicht des Tieres
ermitteln und notieren !!!**
(Wichtig für die Dosierung)

**Weitere Behandlung bei
deutlichen Symptomen**
Krampfen, Sabbern, Kleine Pupillen
Atropine in den Muskel spritzen
0,1 mg pro kg Körpergewicht
10 Minuten warten, bei Bedarf mehrmals
wiederholen

Aufhören, wenn die Pupillen
vergrößert sind

Wenn das Tier noch krampft kann man
Diazepam in den Muskel spritzen
0,1 mg pro kg Körpergewicht
NICHT MEHR!

**So schnell wie möglich
Tierarzt aufsuchen**
Tropf zu Ausspülen des Giftes

Evtl. Konakion als Tabletten weiter geben
(mit Tierarzt absprechen)

Tierarzt aufsuchen !!!
Tropf zum Ausspülen des Giftes

3 Tage weiterspritzen

Hunde	Katzen
1 ml pro Tag	1 ml pro Tag
pro 5 kg Körpergewicht	pro 5 kg Körpergewicht

Konakion (Vitamin K)
in den Muskel spritzen